

**Приложение Б**  
**(справочное)**

**Рекомендуемые дозы внесения сапропелей первого класса пригодности  
под различные сельскохозяйственные культуры**

Т а б л и ц а Б.1

Наименование сельскохозяйственной культуры	Доза сапропеля по общему азоту, кг/га	Примечание
Озимые зерновые	120—140	Перед основной обработкой (вспашка)
Картофель столовый	120—200	Осенью при зяблевой вспашке или весной перед весенней перепахкой
Сахарная свекла	200—300	Осенью перед зяблевой обработкой или весной перед предпосевной обработкой
Кормовая сахарная свекла на корм скоту	200—400	То же
Кукуруза на зеленый корм и силос	240—400	»
Озимые промежуточные культуры	140—180	Под посевную или предпосевную обработку
Многолетние злаковые и злаково-бобовые травы на сено и зеленый корм	240—320	Перед посевом и после укосов в виде удобрительного полива или путем разбрызгивания по поверхности почвы
Капуста	80—100	Под перекопку или рыхление почвы
Огурцы, кабачки, патиссоны, томаты, перец, баклажаны	60—80	Под перекопку или рыхление почвы до посева или высадки рассады
Лук, чеснок, зеленые культуры	60—80	Под перекопку или предпосевное рыхление почвы
Столовые корнеплоды (морковь, свекла и др.)	80—140	То же
Плодовые деревья и кустарники	1 кг под один кустарник, 3 кг под одно дерево	При подготовке посадочной ямы и ежегодно весной по перекопку почвы в приствольном круге, начиная со следующего года после посадки
Однолетние цветочные культуры	60—80	Под перекопку или предпосевное рыхление почвы
Многолетние цветочные культуры, в т.ч. луковичные	80—100	Под перекопку или предпосевное рыхление почвы, подкормка ежегодно весной, начиная со следующего года после посадки
П р и м е ч а н и е — В садоводстве, цветоводстве, лесном, городском хозяйстве сапропели применяют преимущественно в составе питательных субстратов (грунтов).		